

CONSOMMATION D'ALCOOL

Le bilan sanitaire de la consommation excessive d'alcool, s'agissant tant de la morbidité que de la mortalité, est considérable. Une forte consommation d'alcool a de nombreuses conséquences négatives pour la santé et sur le plan social, comme un risque aggravé de cardiopathie, d'accident vasculaire cérébral et de maladie vasculaire, ainsi que de cirrhose du foie et d'apparition de certains cancers. De plus, l'exposition

En bref

La consommation d'alcool mesurée d'après les ventes annuelles à l'aide des données disponibles les plus récentes se situe à 9,5 litres par adulte en moyenne dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Si l'on excepte le Luxembourg, où le volume des ventes nationales entraîne une surestimation de la consommation, l'Autriche, la Corée et la France sont les pays où la consommation d'alcool était la plus élevée en 2010 (12 litres ou plus par adulte et par an). Une faible consommation d'alcool a été relevée en Indonésie, en Inde, en Turquie et en Israël, où les traditions religieuses et culturelles en restreignent la consommation dans certaines catégories de la population, ainsi qu'en Afrique du Sud, en Chine, au Mexique et dans certains pays nordiques (Norvège, Islande et Suède).

Si la consommation moyenne d'alcool a progressivement diminué dans beaucoup de pays de l'OCDE au cours des trente dernières années, elle a augmenté dans d'autres, comme la Corée, l'Islande, la Norvège et la Pologne. On observe un certain rapprochement des habitudes de consommation dans l'ensemble des pays de l'OCDE, avec une progression de la consommation de vin dans nombre de pays traditionnellement buveurs de bière, et vice-versa. Dans les pays producteurs de vin de longue date que sont l'Italie, la France et l'Espagne, de même qu'au Portugal, en Grèce et en Suisse, la consommation par habitant a nettement diminué depuis 1990. La consommation d'alcool a augmenté en Russie, ainsi qu'au Brésil et en Chine, mais dans ces deux derniers pays, la consommation par habitant reste faible.

Les variations de la consommation d'alcool d'un pays à l'autre et dans le temps tiennent non seulement à l'évolution des habitudes de consommation, mais aussi aux mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l'abus d'alcool. Les restrictions visant la publicité et la vente ainsi que les mesures fiscales se sont révélées efficaces pour en réduire la consommation. L'encadrement rigoureux de la vente d'alcool et l'instauration d'une fiscalité élevée se traduisent par une moindre consommation globale dans la plupart des pays nordiques.

Si la consommation d'alcool par habitant dans la population adulte fournit des informations utiles sur les tendances à long terme, elle ne permet pas de distinguer les sous-groupes exposés à des risques en raison d'habitudes de consommation néfastes. La plupart des maladies associées à l'alcool apparaissent chez les personnes qui ont un problème de dépendance. L'absorption de grandes quantités d'alcool en un temps très court, appelée "suralcoolisation occasionnelle" ou "binge drinking" en anglais, est un mode de consommation particulièrement dangereux qui est en progression dans certains pays et certains groupes sociaux, en particulier chez les jeunes hommes.

foétale à l'alcool augmente le risque d'anomalie congénitale et de déficience intellectuelle. L'alcool constitue également un facteur de risque de décès et de handicap en raison des accidents, des agressions, des actes de violence, des homicides et des suicides dont il peut être à l'origine. C'est pourtant l'un des principaux facteurs de risque évitables.

En 2010, l'Organisation mondiale de la santé a adopté une stratégie mondiale de lutte contre l'usage nocif de l'alcool, qui repose sur des mesures directes, comme la mise en place de services médicaux pour traiter les problèmes de santé liés à l'alcool, et des mesures indirectes consistant par exemple à agir sur l'accessibilité et la commercialisation des boissons alcoolisées.

Définition

La consommation d'alcool est mesurée d'après les ventes annuelles d'alcool pur, en nombre de litres, par personne âgée de 15 ans et plus.

Comparabilité

Les méthodes utilisées pour convertir les boissons alcoolisées en alcool pur peuvent différer d'un pays à l'autre. Les statistiques officielles n'intègrent pas la consommation d'alcool non recensée, comme celle des boissons alcoolisées produites à domicile. L'Italie rend compte de la consommation d'alcool dans la population âgée de 14 ans et plus, la Suède à partir de 16 ans, et le Japon à partir de 20 ans. Dans certains pays (ex., Luxembourg), le volume des ventes nationales ne reflète pas exactement la consommation réelle des résidents car les achats des non-résidents peuvent créer une importante différence entre ces ventes et la consommation.

Sources

- "Dépenses de santé et financement", Statistiques de l'OCDE sur la santé (Base de données).

Pour en savoir plus

Publications analytiques

- Huerta, M. et F. Borgonovi (2010), "Education, Alcohol Use and Abuse among Young Adults in Britain", *OECD Education Working Papers*, No. 50, Éditions OCDE.

Publications statistiques

- OCDE (2012), *Health at a Glance: Asia/Pacific 2012*, Éditions OCDE.
- OCDE (2012), *Health at a Glance: Europe 2012*, Éditions OCDE.
- OCDE (2011), *Panorama de la santé : Les indicateurs de l'OCDE*, Éditions OCDE.

Bases de données en ligne

- "Dépenses de santé et financement", Statistiques de l'OCDE sur la santé.


Sites Internet

- Base de données de l'OCDE sur la santé, www.oecd.org/sante/basedonnees.
- Panorama de la santé (matériel supplémentaire), www.oecd.org/sante/panoramadelasante.




Consommation d'alcool des personnes âgées de 15 ans et plus

Litres par habitant, 2010 ou dernière année disponible




Évolution de la consommation d'alcool en litre par habitant parmi les personnes âgées de 15 ans et plus


Évolution (%) en litres par habitant sur la période 1990-2010 ou dernière période disponible



Évolution de la consommation d'alcool des personnes âgées de 15 ans et plus

Litres par habitant





Extrait de :
OECD Factbook 2013
Economic, Environmental and Social Statistics

Accéder à cette publication :
<https://doi.org/10.1787/factbook-2013-en>

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2013), « Consommation d'alcool », dans *OECD Factbook 2013 : Economic, Environmental and Social Statistics*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/factbook-2013-99-fr>

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l'OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel d'enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. Les demandes d'autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du Copyright Clearance Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) contact@cfcopies.com.